

ZONA COLLI TORTONESI	
AVVISO DIFESA VITE N° 7 DEL 03/08/2011	

Situazione

L'anticipo di maturazione rispetto ad un'annata media è attualmente quantificabile in 8-10 giorni. Nei prossimi giorni è previsto un peggioramento del tempo, con l'arrivo di una nuova perturbazione.

Avversità: PERONOSPORA

Nei vigneti in cui la vegetazione è ancora in accrescimento ed ove sono presenti sintomi della malattia, è opportuno effettuare un trattamento a base di RAME, rivolto soprattutto alla parte alta del filare. Attenzione ai tempi di carenza (almeno 20 giorni dalla raccolta per il rame), non trattare su vitigni a maturazione precoce.

Avversità: MUFFA GRIGIA

Contro la muffa grigia è fondamentale la corretta gestione della chioma, con l'asportazione delle foglie in eccesso nella fascia dei grappoli. La lotta diretta prevede interventi con fungicidi specifici da effettuarsi tra l'inviatura ed i 30 giorni che precedono la raccolta. Prodotti utilizzabili: FENEXAMIDE - al massimo 1 trattamento/anno - 7 giorni di carenza;

- CIPRODINIL+FLUDIOXONIL, PIRIMETANIL, MEPANIPIRIM - al massimo 1 trattamento/anno complessivamente con uno di questi prodotti - 21 giorni di carenza;

- BOSCALID (al massimo 1 trattamento/anno) o FLUAZINAM - 28 giorni di carenza (non impiegare in questa fase su varietà a maturazione precoce).

SCAPHOIDEUS TITANUS vettore di FLAVESCENZA DORATA

Si comunica che a causa del diffuso aumento dei sintomi di Flavescenza dorata è consentito effettuare il terzo trattamento contro l'insetto vettore. Il trattamento, da effettuarsi nelle aree ove la malattia è più diffusa e nei vigneti in prossimità di boschi/incolti, potrà essere effettuato prima della vendemmia, compatibilmente con il periodo di carenza dell'insetticida utilizzato, oppure dopo la raccolta delle uve. Prodotti impiegabili: Thiamethoxan (max 1 trattamento per anno), Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Etofenprox (attenzione al periodo di carenza del prodotto utilizzato). Per maggiori indicazioni contattare il servizio tecnico.